



Knowledge grows

YaraLiva™ TROPICOTE™

L'effet immédiat de la forme Nitrique, la qualité en plus avec le Calcium

Caractéristiques physiques*

- Engrais granulé complexe.
- Diamètre moyen en mm (D50)3
- Granulométrie à 4,0 mm ≥ 95%
- Masse volumétrique non tassée en kg/l (densité)1,1
- Dureté des granulés en daN ≥ 5

Autres caractéristiques

- Le diamètre moyen, le resserrement granulométrique et l'absence de poussière (> 0,5 kg/t) permettent d'épandre cet engrais sur de très grandes largeurs (> 36 m).
- Des traitements avec agents anti-massants assurent une bonne conservation et une bonne fluidité.
- La qualité est l'affaire de tous : manipulé et stocké correctement, ce produit conservera ses qualités jusqu'à l'épandage.

Précautions d'emploi

Le nitrate de Calcium est un produit très hygroscopique. Il commence à se solubiliser dès que l'humidité de l'air atteint 50%. Il est enrobé de produit retardant la prise d'humidité, néanmoins il est conseillé de ne pas laisser le produit en contact à l'air libre.

Composition Teneurs en éléments nutritifs déclarés en masse (%)

Azote (N) total	15,5%
Azote Nitrique (NO ₃)	14,4%
Azote Ammoniacal (NH ₄)	1,1%
Oxyde de Calcium (CaO)	26,3%



PFC 1(C)(I)(b)(i) - Engrais minéral solide
Engrais N (CaO) 15,5 (+26,3)

Fertilisant UE

Engrais non DAE
(DAE : Décomposition Auto-Entretenue)

Rubrique ICPE 4702-III
Nomenclature des Installations
Classées pour la Protection de
l'Environnement
(ICPE rubrique-catégorie)

Transport ADR/RID : non soumis
Fabrication : usine de Porsgrunn
(Norvège)

Conditionnement :
Big-bag de 600 kg
ou sac de 25 kg sur palette 1,2 t

Une question ?
Scannez-moi.



© Yara

Code produit Yara® : **PYP CSL**

Dernière mise à jour : 10/2023

Knowledge grows : Le savoir se cultive

Yara® France
Immeuble Opus 12
77 Esplanade du Général de Gaulle - CS 90047
92914 Paris La Défense Cedex
Tél. : 01.55.69.96.00 - Email: contact-fr@yara.com
SIREN 622 042 422 R.C.S. Nanterre
www.yara.fr





Le Nitrate de Calcium de précision

L'assimilabilité de l'azote nitrique est immédiate dès que les racines reprennent leur activité.

Son effet est opérant dans les 24 heures suivant l'application. Il n'est ni stocké, ni rétrogradé par le complexe du sol. Il permet donc d'apporter la dose nécessaire avec une certitude de résultats qui permet une modulation du fractionnement en fonction de l'évolution de la culture.

Pour les reprises en sortie d'hiver

La forme nitrique est la seule forme directement assimilable par les plantes lorsque les conditions de nitrification sont insuffisantes (température du sol trop basse, humidité excessive ou insuffisante). Le Nitrate de Calcium YaraLiva™ TROPICOTE™ est l'engrais de fertilisation azotée idéal de sortie d'hiver et de rattrapage des incidents culturels consécutifs à de mauvaises conditions climatiques. Cas particulier du blé où l'application se fera en 3 apports dans un objectif protéine.

Des avantages exceptionnels

- Azote nitrique, 100 % assimilable immédiatement en toute condition.
- Calcium 100 % soluble et 100% assimilable :
 - maîtrise de la fertilisation azotée,
 - une plus grande fermeté des végétaux,
 - une plus grande résistance aux stress et aux maladies,
 - une meilleure tenue à la conservation.



Le Calcium, l'élément de la qualité et de la conservation

Outre l'azote nitrique, l'apport de Calcium soluble et totalement assimilable, est un très important facteur de qualité des récoltes. Le Calcium a un rôle fondamental dans le maintien de la structure des parois cellulaires ; il améliore la fermeté et la conservation des fruits et des légumes et leur confère une certaine résistance aux attaques parasitaires.

YaraMila™ l'engrais complexe complémentaire à YaraLiva™ TROPICOTE™.

Une gamme d'engrais complexes au sulfate de potassium complémentés en magnésium et oligo-éléments.

Préconisations

Cultures	Périodes d'application	Doses
Cultures maraîchères	1 à 4 apports en couverture suivant les cultures	150 à 250 kg/ha
Cultures industrielles	1 à 2 applications en couverture	200 à 300 kg/ha
Viticulture	Au débourrement	100 à 200 kg/ha
Arboriculture	En sortie d'hiver et après la fleur	200 à 300 kg/ha
Horticulture	1 à 3 passages suivant les espèces	200 kg/ha
Blé	En 3 ^{ème} apport	200 à 400 kg/ha