



DuPont™ Altacor®

Légumes feuilles : laitue, scarole, frisée, mâche, épinard, roquette, chicorée de Trévise et Mizuna

Altacor®, la solution pour contrôler durablement les seuls insectes nuisibles

Les légumes feuilles exigent un contrôle parfait des populations de ravageurs défoliateurs. Leur présentation à la récolte ne souffre ni défaut d'aspect sur les feuilles (perforations, épiderme grignoté), ni présence de ravageurs ou de corps étrangers rendant leur utilisation impossible par le transformateur ou leur préparation difficile par le consommateur.

Recommandations d'emploi sur légumes feuilles

Altacor® est le nouveau standard d'efficacité contre les principales chenilles phytophages. Efficace sur les œufs et les chenilles, Altacor® est peu dépendant des conditions de température, d'ensoleillement et de lessivage. Altacor® est utilisable selon les conditions suivantes sur légumes feuilles :

Cultures de serre ou plein champ	Ravageurs	Doses	Délai avant récolte	Délai de rentrée	Zone non traitée
Épinard, Laitue Scarole et Frisée Mâche, Roquette Chicorée de Trévise Feuilles de Brassicacées (Mizuna)	Noctuelle gamma Noctuelle du chou, Héliothis Légionnaire de la betterave Noctuelle méditerranéenne	85 g/ha	1 jour	6 heures en plein champ 8 heures en milieu fermé	5 mètres par rapport aux points d'eau


Altacor® est utilisable en période de production d'exsudats en dehors de la présence d'abeilles.

Positionnez Altacor® au début des éclosions

Une ou deux applications de Altacor® à la dose de 85 g/ha, espacées de 7 à 10 jours, dès les premières éclosions de noctuelle gamma, de noctuelle du chou, d'Héliothis, de légionnaire de la betterave ou de noctuelle méditerranéenne, permettent de contrôler les œufs et les larves de ces ravageurs. En conséquence, les feuilles des cultures de salades d'été et d'automne sont protégées de l'apparition des dégâts de ces chenilles.

Afin de positionner ces traitements de façon optimale, se référer aux Bulletins de Santé du Végétal des DRAAF ou aux bulletins techniques des services agronomiques des organisations professionnelles.

Positionnement recommandé
de Altacor® en culture de laitue



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

DuPont™ Altacor®


Le standard d'efficacité pour contrôler les chenilles

Altacor® assure la protection des salades destinées au marché de frais et de quatrième gamme avec un très haut niveau d'efficacité.

Altacor® est actif sur les principales chenilles défoliatrices (*A. gamma*, *H. armigera*).

Efficacité sur *H. armigera* en culture de laitue à T 4 + 3 jours

Essai DuPont 2008



Programme : T 1 (4 feuilles), T2 : T1 + 7 j, T3 : T2 + 7 j, T4 : T3 + 14 j


Souplesse de positionnement

Altacor® possède un mode d'action ovo-larvicide et larvicide tous stades qui lui confère une grande souplesse d'utilisation.

Altacor® évite l'apparition de dégâts grâce à un arrêt rapide de la prise de nourriture des ravageurs, quelque soient leurs formes.

Evolution du nombre de feuilles touchées par plante suite à une double application

Essai DuPont 2007



Longue persistance et contrôle durable des chenilles


Altacor® présente une grande persistance d'action, peu dépendante des conditions de température, d'ensoleillement et de lessivage, et une diffusion translaminare.

Utiliser Altacor® pour protéger vos salades permet de simplifier le travail et d'obtenir une efficacité maximale des programmes de protection intégrée à faible risque sur la faune auxiliaire.

Proportion de feuilles attaquées par *Autographa sp.*

12 jours après la dernière application en culture de laitue

Essai DuPont 2013



Afin de prévenir l'apparition ou le développement de phénomènes de résistance, Altacor® doit s'intégrer dans un programme de traitement contenant des insecticides à modes d'action différents.

Les mélanges doivent être mis en œuvre conformément à la réglementation en vigueur et aux recommandations des guides de bonnes pratiques officielles des mélanges de produits phytopharmaceutiques.

DuPont™ Altacor® : Granulés à disperser dans l'eau [WG] contenant 350 g/kg (35 %) de chlorantraniliprole [RynaXypyr®]. A.M.M. Provisoire n° 2100122. H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. SPe8 avec mention 'Emploi autorisé durant la floraison et en période d'exsudats' en dehors de la présence d'abeilles pour les usages indiqués sur l'étiquette. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. Consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Pour les usages autorisés, doses, conditions et précautions d'emploi, restrictions et contre-indications, se référer à l'étiquette du produit et/ou www.phytodata.com. Altacor® et RynaXypyr® sont des marques déposées de E.I. du Pont de Nemours and Company. Homologué et distribué par DuPont Solutions (France) S.A.S. - Défense Plaza - 23/25, rue Delarivière Lefoullon Défense 9 - F-92800 Putaux - Tél. 01 41 97 44 00 - RCS Nanterre B 492 951 306 - www.agfrance.dupont.com - DuPont Solutions (France) S.A.S. est agréée par le Ministère de l'Agriculture en tant qu'entreprise exerçant une activité de distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels N° d'agrément : IF 01741. Lire attentivement l'étiquette avant toute utilisation.



The miracles of science™