



ALTO'STRESS®



Getade

L'Agriculture renoue avec la Nature®

SUBSTANCE NATURELLE A USAGE BIOSIMULANT

ALTO'STRESS®

ALTO'STRESS® est un produit à base d'extraits végétaux biostimulant naturellement les plantes :

- Huile essentielle de Cannelle - Huile essentielle de Lemongrass
- Extrait hydro alcoolique de Genévrier - Extrait hydro alcoolique de Reine des Prés - Extrait hydro alcoolique d'Ail - Extrait hydro alcoolique de Fenugrec – Extrait hydro alcoolique de Fenouil – Extrait hydro alcoolique de Giroflier

Produit utilisable en Agriculture Biologique en application du règlement CE 834/2007 et du règlement Américain NOP (National Organic Program).

MODE D'EMPLOI

ALTO'STRESS® s'applique en pulvérisation de préférence le soir sauf en cas de période chaude où l'application ne se fera que très tôt le matin. Traiter toute la surface foliaire.

Il est fortement conseillé d'associer à **ALTO'STRESS®** un mouillant végétal. Le pH de la bouillie doit être compris entre 4.4 et 4.6.

Eviter les fortes amplitudes de température (>12°C <25°C). au pulvérisateur. Eviter les fortes amplitudes thermiques (mini 12-15°C – maxi 28-30°C).

A renouveler dans les 48h suivant une pluie supérieure à 25mm.

ALTO'STRESS® s'utilise en pulvérisation foliaire en Grandes Cultures, Arboriculture, Cultures maraichères, Petits fruits, Vigne, Pelouses, Greens, Terrains de sports.

Se reporter à l'étiquette « Cultures, doses et mode d'emploi »

Conditionnement : 10 L

Cultures, doses, mode d'emploi ALTO'STRESS®					
Cultures préconisées	Dose par apport en l/ha		Nombre d'apports/an	Stades d'apports recommandés Stade BBCH de la culture	Précautions particulières: Sélectivité, mélanges possibles, mélanges déconseillés, condition de climat à éviter, condition de sol à éviter, cultures proscrites.
	Dose	Volume d'eau			
VITICULTURE	1,5 L/ha	100 L à 150 L	4	BBCH 57-60 Boutons floraux séparés BBCH 68-69 Chute des capuchons BBCH 71 Nouaison BBCH 77-79 Fermeture de la grappe	ALTOSTRESS® s'applique en pulvérisation de préférence le soir sauf en cas de période chaude où l'application ne se fera que très tôt le matin. Il est fortement conseillé d'associer à ALTO'STRESS® un mouillant végétal. Le pH de la bouillie doit être compris entre 4,4 et 4,6. Eviter les fortes amplitudes de température (>12°C <25°C).
ARBORICULTURE					
ABRICOTIERS	3L/ha	1000 L	4	BBCH 67 Chute des pétales BBCH 71 Nouaison BBCH 72-73 Grossissement	ALTOSTRESS® s'applique en pulvérisation de préférence le soir sauf en cas de période chaude où l'application ne se fera que très tôt le matin. Il est fortement conseillé d'associer à ALTO'STRESS® un mouillant végétal. Le pH de la bouillie doit être compris entre 4,4 et 4,6. Eviter les fortes amplitudes de température (>12°C <25°C).
CERISIERS			4		
NECTARINES			4		
NOISETIERS			4		
NOYERS			4		
PECHERS			4	BBCH 67 Chute des pétales BBCH 71 Nouaison BBCH 72-73 Grossissement BBCH 74 fruits 40 mm	
POIRIERS			4	BBCH 57 Bouton rose BBCH 69 Chute des pétales BBCH 71 Nouaison BBCH 72 Grossissement	
POMMIERS			4		
OLIVIERS	3 L/ha	1000 L à 2000 L	4	BBCH 57-59 Apparition de la corolle verte BBCH 69 Chute des pétales BBCH 71 Nouaison BBCH 72 Grossissement	
CITRIQUES		1500 L à 2000 L	4		
CULTURES MARAÎCHÈRES ANNUELLES					
POMMES DE TERRE	2,5 L/ha	200 L	2 traitements si arrachage à 90 jours	BBCH 40-49 Formation du tubercule BBCH 51-59 Préfloraison	Utiliser ALTO'STRESS® en complément de SEMA'ZEN®. ALTOSTRESS® s'applique en pulvérisation de préférence le soir sauf en cas de période chaude où l'application ne se fera que très tôt le matin. Il est fortement conseillé d'associer à ALTO'STRESS® un mouillant végétal. Le pH de la bouillie doit être compris entre 4,4 et 4,6. Eviter les fortes amplitudes de température (>12°C <25°C).
	2 L/ha	200 L	3 traitements si arrachage à + de 120 jours	BBCH 40-49 Formation du tubercule BBCH 51-59 Préfloraison BBCH 81-89 Maturation	
MELONS	3 L/ha	400 L	3 traitements pendant le cycle végétatif	Post floraison diamètre 5 à 10 cm Post floraison diamètre 10 à 15 cm	
AUBERGINES	3 L/ha	400 L	3 applications à 16-18 jours d'intervalle	En végétation, post floraison	A renouveler 48 h après si nécessaire Utiliser ALTO'STRESS® en complément de SEMA'ZEN®. ALTOSTRESS® s'applique en pulvérisation de préférence le soir sauf en cas de période chaude où l'application ne se fera que très tôt le matin. Il est fortement conseillé d'associer à ALTO'STRESS® un mouillant végétal. Le pH de la bouillie doit être compris entre 4,4 et 4,6. Eviter les fortes amplitudes de température (>12°C <25°C).
BETTERAVES					
CAROTTES					
POIREAUX					
POIVRONS					
SALADES					
TOMATES					
CULTURES MARAÎCHÈRES PERENNES					
FRAISES	3 L/ha	400 L	4	BBCH 41 Début formation des stolons BBCH 55 Fleurs dans la rosette BBCH 71-73 Développement des fruits	Utiliser ALTO'STRESS® en complément de SEMA'ZEN®. ALTOSTRESS® s'applique en pulvérisation de préférence le soir sauf en cas de période chaude où l'application ne se fera que très tôt le matin. Il est fortement conseillé d'associer à ALTO'STRESS® un mouillant végétal. Le pH de la bouillie doit être compris entre 4,4 et 4,6. Eviter les fortes amplitudes de température (>12°C <25°C).
FRAMBOISES	3 L/ha	400 L	4	BBCH 31-39 Pousse des cannes BBCH 51 Premiers boutons visibles BBCH 71-73 Développement des fruits	
ASPERGES	3 L/ha	400 L	3	A la plantation ou au buttage. BBCH 60-80 A partir du stade épanouissement des cladodes jusqu'à début maturité	Utiliser ALTO'STRESS® en complément de SEMA'ZEN®. ALTOSTRESS® s'applique en pulvérisation de préférence le soir sauf en cas de période chaude où l'application ne se fera que très tôt le matin. Il est fortement conseillé d'associer à ALTO'STRESS® un mouillant végétal. Le pH de la bouillie doit être compris entre 4,4 et 4,6. Eviter les fortes amplitudes de température (>12°C <25°C).
GRANDES CULTURES					
CEREALES A PAILLE	1.5 L/ha	200 L à 400 L	3	BBCH 07-09 Coléoptile BBCH 20-21 Début tallage BBCH 30-31 Début montaison BBCH 51-53 Début épiaison	A renouveler si nécessaire ALTOSTRESS® s'applique en pulvérisation de préférence le soir sauf en cas de période chaude où l'application ne se fera que très tôt le matin. Il est fortement conseillé d'associer à ALTO'STRESS® un mouillant végétal. Le pH de la bouillie doit être compris entre 4,4 et 4,6. Eviter les fortes amplitudes de température (>12°C <25°C).
MAÏS	1.5 L/ha	200 L à 400 L	2	4 à 6 feuilles 10-12 feuilles	
GAZONS					
GREENS - TERRAINS DE SPORT - PELOUSES	5 L/ha	300 L à 400 L	2 à 3	Pendant le cycle végétatif	