

FICHE TECHNIQUE ARCHER RUPTOR

ARCHER RUPTOR est un biostimulant qui favorise la bourgeonnement et complète l'accumulation d'heures de froid en cas de conditions climatiques trop chaudes, de plus en plus fréquentes en raison du changement climatique. L'application d'**ARCHER RUPTOR** améliore et uniformise le bourgeonnement, homogénéise les stades phénologiques, la floraison et la maturation des fruits, augmentant ainsi la production.

1. CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Aspect : liquide.

Couleur : jaunâtre.

Densité : 1,27 – 1,28 gr/cc.

2. CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES

Azote (N) total	15 % p/p
Azote (N) nitrique	5,2 % p/p
Azote (N)uréique	6,3 % p/p
Azote (N) ammoniacal	3,5 % p/p
Oxyde de calcium (CaO) hydrosoluble	3 % p/p
Fer (Fe) hydrosoluble et chélaté par EDTA	0,05 % p/p
Zinc (Zn) hydrosoluble et chélaté par EDTA	0,05 % p/p

pH : 4 – 5

3. FORMATS COMMERCIAUX

1 L 5 L 25 L 210 L 1000 L

4. CULTURES ET DOSES

CULTURE	DOSE	CALENDRIER D'APPLICATION
Cerisier	4-6 L/100 L de solution. Appliquer en même temps que Archer Boost à raison de 8 L/100 L jusqu'au point de goutte.	1 application 45 (± 5) jours avant le débourrement (s'assurer que les bourgeons sont au stade A ou au stade hivernal avant le gonflement du bourgeon).
Raisins (de table et de vinification)	5-7 L/100 L de solution. Appliquer en même temps que Archer Boost à raison de 10- 16 L/100 L jusqu'au point de goutte.	1 application 60 (± 5) jours avant le débourrement (bourgeons au stade A ou au stade hivernal).

5. COMPATIBILITÉS

Compatible avec les fertilisants, fongicides et insecticides les plus courants. Ne pas mélanger avec des huiles minérales, du cuivre, du soufre ou leurs dérivés. Ne pas appliquer si vous n'avez pas d'expérience préalable sur la culture