

KRELI®

A pleine puissance contre le mildiou de la pomme de terre



certisbelchim.fr



Certis Belchim
GROWING TOGETHER

**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**



Protection anti-mildiou des jeunes pousses du feuillage et du tubercule

Mode d'action :

2 matières actives complémentaires aux multiples caractéristiques

VALIFENALATE 150 g/l
(CAA, FRAC 40)

CYAZOFAMIDE 80 g/l
(QiI, FRAC 21)

TRANSLAMINAIRE

Absorbé par la partie supérieure de la feuille, il assure aussi une protection de la partie inférieure.

DIFFUSANT

Redistribution du valifénalate dans la cuticule cireuse des feuilles permettant une protection des organes en croissance.

ANTI-SPORULANT

Actif sur la croissance mycélienne.
Actif contre la germination des spores.

CONTACT PREVENTIF

Protection de la surface de la feuille grâce à un étalement optimisé


REDISTRIBUTION

Protection des pousses en croissance grâce à sa formulation spécifique.


SPORICIDE

La cyazofamide présente une excellente activité sur la viabilité des spores (germination directe et indirecte) permettant ainsi une forte réduction des contaminations (feuillage et tubercule).

Formulation adjuvantée spécifique assurant un super étalement



Application d'un fongicide de formulation classique à 150 l/ha de bouillie



Application d'Areli® à 150 l/ha de bouillie - effet super étalant



Protection jusqu'au cœur des jeunes pousses



Répartition optimisée sur les tiges




Etalement sur l'intégralité du feuillage (y compris le feuillage inférieur)

Areli[®], efficace sur l'ensemble des souches à ce jour, grâce à ses 2 modes d'action


Areli[®] face aux souches sensibles

% Efficacité finale calculée selon AUDPC (aire sous la courbe) dans 26 essais



Areli[®] face à la souche EU 43_A1 (résistante aux CAA)


% Efficacité finale calculée selon AUDPC (aire sous la courbe) dans 3 essais



Quel que soit le type de souche connu à ce jour (résistante ou non), la combinaison des modes d'action de ses deux matières actives permet à Areli[®] d'obtenir des résultats réguliers et de très haut niveau.

Positionnement

Stades d'application : utilisable sur une majeure partie de la saison (BBCH 17 à 89), positionnement privilégié : croissance active.



Les points forts

- **Modes d'action complémentaires : sécurisation de l'efficacité et protection vis-à-vis de la résistance.**
- **Polyvalent : utilisable sur une majeure partie de la saison (BBCH 17 à 89).**
- **2 matières actives pour mieux protéger les jeunes pousses (positionnement privilégié en croissance active.)**
- **Combinaison d'une action antispোরulant et d'une action sporicide : forte réduction des contaminations (feuillage et tubercule).**
- **Excellente résistance au lessivage (100 mm) – à l'abri du lessivage en 30 minutes.**



Caractéristiques techniques réglementaires

Culture : pomme de terre

Cible : mildiou

Composition : Cyazofamide 80 g/l + Valifenalate 150 g/l

Formulation : Suspension Concentrée (SC)

Dose homologuée	Nombre d'applications	Intervalle de traitement (jours)	Stades de traitement (BBCH)	Délai avant récolte (DAR)	ZNT aquatique	DSPPR	Délai de rentrée (DRE)
1 l/ha	4	5 à 7 jours	17-89	7 jours	5 mètres	3 mètres	48 heures

Areli®, AMM 2230340, 150 g/l (14,13 % p/p) valifénalate + 80 g/l (7,54 % p/p) cyazofamide. ® Marque déposée et homologation Certis Belchim BV., Stadsplateau 16, 3521 AZ Utrecht Pays-Bas. Distribué par Certis Belchim BV, 5 rue Galilée, 78280 Guyancourt T 01 34 91 90 00. N°d'agrément : IF01808 Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit et/ou www.phytodata.com. Fév.25



ATTENTION.



H317 Peut provoquer une allergie cutanée.



H351 Susceptible de provoquer le cancer.

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques ; entraîne des effets néfastes à long terme.

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

