



BAÏKAL WP



AMM n° 2100038

Barrière Minérale Répulsive

POIRIER - Psylle(s)



MODE D'ACTION :

Les psylles du poirier sont des ravageurs piqueur-suceurs du poirier provoquant des dégâts directs et indirects sur les rameaux et les fruits. Ces dommages affectent alors la qualité et la quantité de la récolte. **BAÏKAL WP** crée un manteau protecteur sur l'ensemble du végétal. Il perturbe l'insecte dans la reconnaissance des feuilles, dans son alimentation et gêne les femelles dans l'acte de ponte (texture). Les dégâts sont alors réduits de manière considérable. La pellicule blanche ne perturbe pas le bon fonctionnement de la plante (photosynthèse). Le **BAÏKAL WP** améliore aussi la qualité de l'épiderme des fruits.



DOSAGES :

Première génération (hiver à floraison) :

(La lutte est déterminante sur cette période!)

Appliquer **BAÏKAL WP** à 30 kg/ha dès que 50% des femelles hivernantes sont prêtes à pondre (cf Avertissements agricoles et bulletins divers)
Renouvellements effectués à 30 kg/ha.

Générations suivantes (post-floraison) :

(Vient confirmer la lutte amorcée en G1)

Appliquer dès la chute des pétales (30 kg/ha) puis renouveler (30kg/ha) jusqu'à un maximum de 7 applications/ha/an.

PREPARATION et MATERIELS :

Utilisez un pulvérisateur préalablement bien réglé pour un recouvrement optimal des bois (en hiver) ou de la végétation (post débourrement). Choisissez des buses adaptées à l'application des produits de contact (à turbulence, avec ou sans dispositif anti-dérive selon la période des traitements). Préférer des buses en céramique. Utilisez la quantité d'eau nécessaire pour un bon mouillage, mais sans atteindre le point de ruissellement (variable selon les spécifications du matériel).

Introduisez les 2/3 de l'eau nécessaire dans la cuve puis enclenchez l'agitation (à maintenir pendant toute la durée du traitement) avant d'introduire le produit en pluie. Complétez le 1/3 d'eau restant. Après application, bien nettoyer l'ensemble du matériel à l'eau claire.

APPLICATIONS :

Commencer les applications dès le début de la période à risque.

Travailler à pression réduite (5-10 bars).

Traiter par temps calme et sec.

Croiser les applications entre chaque traitement.

Le recouvrement doit être optimal et entretenu pendant toute la période à risque (la lutte est déterminante en pré-floraison).

Il est nécessaire de réappliquer **BAÏKAL WP** lorsque le cumul des pluies est supérieur à 25 mm, et/ou le vent est important et/ou la pousse du végétal le justifie.

DAR = 15j ; DRE = 6h ; 7 applications à 30 kg/ha/an

**VOIR SCHEMA D'UTILISATION
AU DOS DE CETTE FICHE**

**SAC 25 kg
Palette 1 T**

AGRI-SYNERGIE

24 rue de varsovie -
24000 Périgueux

agrisynergie@agrisynergie.com



AGRI-SYNERGIE



HIVER

PRINTEMPS

ETE



01/51

Début gonflement



on voit les étamines



chute des derniers
pétales



légende :



Traitements

51 = Stades
repères BBCH

B = Stades
repères Fleckinger

1° GENERATION (G1)

GENERATIONS ultérieures

**50% femelles matures
(début de la période à
risque G1)**

30kg/ha

7-21 j *

30kg/ha

7-21 j *

30kg/ha

(1 semaine)

Dès la chute des
pétales (début de la
période à risque
suivante)

30kg/ha

7 j

30kg/ha

7 j

30kg/ha

7 j

30kg/ha

* renouvellement selon
l'intensité des pluies (>25mm),
de l'altération de la pellicule par
le vent ou de la pousse

Attention : marquage des fruits
possible pour des applications
de post-floraison tardives, même
après lavage

SOKA



société
kaolinère
américaine