




FERTILISATION CULTURES SPÉCIALES

# Basafer® Plus

- Pour la prévention et la lutte contre la chlorose ferrique
- Pour toutes les cultures (vigne, arbres fruitiers, cultures ornementales et maraîchères)
- 2 modes d'application  
> apport au sol  
> solution nutritive par ferti-irrigation



## Chélate de fer EDDHA

(5% Fe ortho-ortho pour apport au sol ou en fertigation)

- Basafer® Plus est destiné à combattre la chlorose ferrique particulièrement en sols calcaires.
- Basafer® Plus sera appliqué au sol ou par ferti-irrigation mais jamais en application sur le feuillage (à cause de sa teinte rouge).
- Basafer® Plus sera appliqué sur sol frais ou humide.



### CONDITIONNEMENT :

Boîte carton de 15 kg  
(3 x 5 kg en sacs ALU-PE)

Boîte carton de 10 kg  
(10 x 1 kg)

**Basafer® Plus** est un chélate de fer de l'acide EDDHA pour la prévention et la lutte contre la chlorose ferrique de toutes les cultures.

Avec sa teneur importante en isomère ortho-ortho (supérieur à 80% de la forme chélatée), **Basafer® Plus** contient une quantité élevée de fer directement assimilable et très efficace.

## Préconisations

### • En apport au sol


| Cultures                            | Doses par apport au sol | Observations                                                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arbres fruitiers                    | 40 à 60 g/arbre         | Application au début du printemps ou à l'apparition de la chlorose                                                         |
| Fruits rouges                       | 2 à 5 g/m <sup>2</sup>  |                                                                                                                            |
| Cultures florales<br>Fleurs coupées | 2 à 5 g/m <sup>2</sup>  |                                                                                                                            |
| Cultures maraîchères                | 1 à 2 g/m <sup>2</sup>  | Application 2 à 6 semaines après la plantation. A recommencer après 2 à 6 semaines si nécessaire ou avant l'apparition des |
| Vigne                               | 6 à 10 g/pied           | Application avant le débourrement de la vigne ou à l'apparition de la chlorose                                             |

### • En solution nutritive pour fertirrigation

|                       |                  |                                      |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|
| Dose curative         | 0,1 à 0,2 g/l    | Dans la solution fille               |
| Dose préventive       | 0,005 à 0,02 g/l |                                      |
| 5 à 20 g/kg d'engrais |                  | Dans la solution mère (et doseur 1%) |

Dosage en fonction du niveau de chlorose

Différents stades de chlorose de la vigne



## Propriétés

Les sols à pH élevés ou à forte teneur en métaux lourds entravent l'assimilation du fer par les plantes.

La forme chélatée EDDHA du fer de **Basafer® Plus** permet d'éviter ces carences.

**Basafer® Plus** est un chélate de fer complet (100%) et à forte proportion en isomère ortho-ortho (83%) soit 5% Fe.

**Basafer® Plus** est très stable dans les sols, même calcaires, grâce à sa qualité ortho-ortho EDDHA élevée.

Sa formulation DF (Dry Flowable) présente de nombreux avantages :

- dispersion rapide,
- bonne tenue en suspension (pas de bouchage de goutteurs ou de jets),
- manipulation propre (pas de poussières),
- dosage facile sans dépôt dans l'emballage.

## Recommandations d'application

- Ne pas traiter le feuillage des végétaux avec **Basafer® Plus**. Stocker à l'écart des aliments et hors de portée des enfants.
- Nettoyer et rincer soigneusement les appareils de traitement après emploi.
- Il est recommandé d'enfouir **Basafer® Plus** dans le sol après chaque application.

## Recommandations de transport et de stockage

Protéger le produit de la chaleur et de l'humidité et éviter une exposition directe au soleil. Stocker à une température supérieure à 5 °C et ne dépassant pas 25 °C pendant une durée prolongée.

Conserver le produit dans son emballage d'origine dans un endroit frais.

## Composition

Engrais CE

Chélate de fer - EDDHA

6% de fer (Fe) soluble dans l'eau (100% chélaté par l'EDDHA), dont 5 de fer chélaté par l'ortho-ortho EDDHA.

Utilisable en Agriculture Biologique selon règlement CE 834/2007.

Fiche de données de sécurité disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)