



BELLALI®

La meilleure des attaques,
c'est une solide défense.



La stratégie fongicide
intelligente et toujours
gagnante


- Un fongicide performant sur tous les terrains : blé, orge, triticale, seigle
- Une défense solide contre les maladies des céréales : septoriose, rouilles, ramulariose, helminthosporiose, rhynchosporiose
- Un fongicide prêt à l'emploi à double mode d'action - dont un multisite unique - et sans triazole, pour contrer les résistances
- Un rendement gagnant dans vos champs





FONGICIDE

Stades d'application



Spectre d'efficacité


Efficacité Blé



Septoriose (7)



Rouille brune (9)



Rouille jaune (8)


— BELLALI® 2,0 L/HA
 — FOLPEL 1,5 L/HA
 — AZOXYSTROBINE 0,6 L/HA

(X) NOMBRE D'ESSAIS MENÉS


Efficacité Orge



Rynchosporiose (6)



Ramulariose (4)



Helminthosporiose (4)





Rouille naine (7)

— BELLALI® 2,0 L/HA
 — FOLPEL 1,5 L/HA
 — AZOXYSTROBINE 0,6 L/HA

(X) NOMBRE D'ESSAIS MENÉS

Impact sur les rendements



Le folpel

Un fongicide multisite indispensable

Le folpel est le seul fongicide de contact à action multisite classé MO4 selon le FRAC (Fungicide Resistance Action Committee). Son mode d'action multisite repose sur l'inhibition de plusieurs processus biologiques des agents pathogènes, limitant ainsi leur capacité à développer des résistances.



Le folpel

Fongicide multisite de contact, formant une barrière protectrice sans pénétration dans les tissus

MSI

- Multisite agit sur plusieurs cibles (adaptation difficile du champignon)

- **Mode d'action unique FRAC** GROUPE M04 FONGICIDE

PROTECH - Seul fongicide RESISTANCE BREAKER utilisé en céréales*

- Septoriose dont les souches CarR, CarHR (résistantes et hautement résistantes aux SDHI) et MDR (Multi-résistantes)
- Helminthosporiose
- Ramulariose
- Mildiou, blackrot, excoriose (secondaire oïdium/botrytis) de la vigne

Formulation innovante

- Meilleur mouillage
- Diffusion plus efficace et plus rapide du fongicide dans la plante
- Couche protectrice uniforme



(* RÉSEAU PERF 23X24) - (* ÉTUDE ADAS 23)

i Le **FRAC** (Fungicide Resistance Action Committee) recommande l'utilisation des multisites dans le management des résistances

Plus d'informations
en flashant ce code



BELLALI®

Deux modes d'action



GROUPE 11 FONGICIDE

GROUPE M04 FONGICIDE

Composition

75 g/L azoxystrobine
375 g/L folpel

Conditionnement

Bidon de 5L

Formulation

SC

Famille chimique

L'azoxystrobine appartient à la famille des strobilurines.

Le folpel est un multisite de la famille des phthalimides.

Tableau des usages autorisés

Culture	Cibles	Dose max. d'emploi	Nombre max. d'applications	Stade d'application	Délai avant récolte (jours)	Zone non traitée aquatique
Blé dur d'hiver, blé tendre d'hiver, blé dur de printemps, blé tendre de printemps, tritordeum	Helminthosporiose, septoriose, rouille(s) dont rouille jaune et rouille brune	2L/ha	1/an/culture	Entre les stades BBCH 30 et BBCH 59	BBCH 59 max	20 mètres (dont DVP 5 mètres)
Triticale	Septoriose, rouille(s)					
Orge d'hiver, orge de printemps	Helminthosporiose, ramulariose, rhynchosporiose, rouille(s) dont rouille naine	2L/ha	1/an/culture	Entre les stades BBCH 30 et BBCH 59	BBCH 59 max	20 mètres (dont DVP 5 mètres)
Seigle	Rhynchosporiose, rouille(s)	2L/ha	1/an/culture	Entre les stades BBCH 30 et BBCH 59	BBCH 59 max	20 mètres (dont DVP 5 mètres)

DVP : dispositif végétalisé permanent.

Délai de rentrée sur la parcelle : 48 heures après traitement.

Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et :

- l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement ;
- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents.
- Spe2 : Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer sur sols artificiellement drainés ayant une teneur en argile supérieure ou égale à 45% pour des applications sur céréales d'hiver
- Spe8 : Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas utiliser en présence d'abeilles et autres insectes pollinisateurs.

BELLALI® : AMM N° : 2250086 - SC - azoxystrobine 75 g/L + Folpel 375 g/L - Attention : H317, H319, H332, H351, H410

ZOYA® : AMM N° : 2240236 - EC - Concentré émulsionnable - prothioconazole 150g/L + flupyroxade 75g/L - Danger : H315, H318, H362, H411

AZOXYSTROBINE - Danger : H331, H400, H410

FOLPEL - Danger : H332, H319, H317, H351, H400

Respectez les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi mentionnés sur l'étiquette du produit et/ou consultez www.adama.com et/ou www.phytodata.com. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. ©Marque déposée Adama Frances.a.s.- RCS N° 349428532. Agrément n° IF01696 : Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. Septembre 2025. Annule et remplace toute version précédente.

BELLALI®

ATTENTION

H317 : Peut provoquer une allergie cutanée

H319 : Provoque une sévère irritation des yeux

H332 : Nocif par inhalation

H351 : Susceptible de provoquer le cancer

H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



ZOYA®

DANGER

H315 : Provoque une irritation cutanée

H318 : Provoque de graves lésions des yeux

H362 : Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel

H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme



ADAMA France s.a.s | 33 rue de Verdun | 92156 Suresnes Cedex | Tél. : 01 41 47 33 33 | www.adama.com

PRODUIT POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.