

BOUILLIE BORDELAISE CAFFARO WG

Type d'action

Fongicides

Composition

Sulfate De Cuivre 200 G/kg

N°A.M.M.

2110006

Formulation

(WG) GRANULES A
DISPERSER DANS L'EAU

Conditionnement

20kg

Usages autorisés

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
VIGNE - RAISIN DE CUVE EN RAISON D'UN RISQUE DE MARQUAGE, NE PAS APPLIQUER SUR RAISIN DE TABLE AU DELÀ DU STADE BBCH 71,	TRT PART.AER.	MILDIOU	5 KG/HA	3	21 JOURS	20 M
VIGNE - RAISIN DE TABLE EN RAISON D'UN RISQUE DE MARQUAGE, NE PAS APPLIQUER SUR RAISIN DE TABLE AU DELÀ DU STADE BBCH 71,	TRT PART.AER.	MILDIOU	5 KG/HA	3	21 JOURS	20 M
VIGNE EN RAISON D'UN RISQUE DE MARQUAGE, NE PAS APPLIQUER SUR RAISIN DE TABLE AU DELÀ DU STADE BBCH 71,	TRT PART.AER.	MILDIOU	5 KG/HA	3	21 JOURS	20 M

Performances / conditions d'emploi

Dose et Conditions d'emploi

BOUILLIE BORDELAISE CAFFARO WG doit s'utiliser en applications préventives avant les contaminations. Suivre les préconisations indiquées dans les Bulletins Phytosanitaires.

En viticulture conventionnelle, la BOUILLIE BORDELAISE CAFFARO WG est particulièrement adaptée aux traitements de couverture de fin de saison, de la nouaison jusqu'à 3 semaines avant vendanges. Elle permet un maintien du feuillage sur la vigne. Dose d'emploi conseillée : 4 à 5 kg/ha. Renouvellement des applications tous les 7 à 15 j., à adapter en fonction des pluies lessivantes.

En mode de production biologique, la BOUILLIE BORDELAISE CAFFARO WG s'utilise tout au long de la période de sensibilité de la vigne au mildiou. Adapter la dose (de 2 à 5 kg/ha) à la croissance de la végétation, aux risques de pluies, aux possibilités de pénétrer dans les parcelles

NB : Vigne destinées à la production de raisins de table : En raison d'un risque de marquage des grains, ne pas utiliser

Recommandations

- Pour l'applicateur porter des gants, des vêtements de protection appropriés et un appareil de protection des yeux approprié pendant la phase d'application.



55, rue Raspail CS80105 92594
Levallois-Perret Cedex Tél. : 01 47
59 77 00 - Fax : 01 47 37 54 52 -
www.phyteurop.com - Agrément
numéro IF017155 : distribution de
produits phytopharmaceutiques à
des utilisateurs professionnels et
non professionnels.

**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRECAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

Nom commercial

BOUILLIE BORDELAISE CAFFARO WG

**Mention d'avertissement : Attention****Mention de danger :**

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H332 Nocif par inhalation.

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence :

P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P273 Éviter le rejet dans l'environnement.

P304+P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P501 Éliminer le contenu/récipient par un service de collecte spécifique.

SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. [Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.]

SPe 3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 mètres par rapport aux points d'eau. Pour protéger les plantes non cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente,

DRE :

24h

Détenteur homologation :

ISAGRO

Marque déposée :

ISAGRO

Réglementation transport ADR : Voir FDS

- Pour le travailleur : Porter un vêtement de protection approprié.

- Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.

- Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

- Éviter de s'exposer au brouillard de pulvérisation.

- Se laver les mains et le visage dès le travail terminé et avant de prendre toute nourriture.

- Agiter énergiquement la préparation avant utilisation après stockage à haute température.

- Protéger la préparation de l'humidité

Mélanges

Les mélanges doivent être mis en oeuvre conformément à la réglementation en vigueur et aux recommandations des guides de bonnes pratiques officiels.