

CATANE®

Biocontrôle hivernal des acariens, pucerons et cochenilles en arboriculture

CATANE®,
huile de paraffine,
substance naturelle de
biocontrôle



Catane® est une huile de paraffine qui s'utilise pour les traitements d'hiver des arbres fruitiers à pépins et à noyaux. Elle agit par asphyxie sur les oeufs et les larves, avec un niveau d'efficacité élevé sur acariens, pucerons et cochenilles.

Substance naturelle de biocontrôle utilisable en AB

Catane® figure sur les listes Nodu Vert et biocontrôle (liste étendue substances naturelles, juillet 2017). À base d'huile de paraffine biodégradable, Catane® est utilisable en Agriculture Biologique, conformément au règlement (CE 834/2007) et dans le cadre de la PFI, Protection Fruitière Intégrée.



Testée et approuvée !

99,2%
d'efficacité sur
cochenille*

Essai Italie 2011 : 1 application
Catane® 2,5L / 100L contre
Saissetia oleae sur pêcher.

91,8%
d'efficacité sur
puceron*

Essai Italie 2011 : 1 application
Catane® 2,5L / 100L contre puceron
sur prunier.

97,9%
d'efficacité sur
acarien*

Essai France 2007 : 1 application
Catane® 2,5L / 100L contre acarien rouge
Panonychus ulmi sur pommier.

* Efficacité corrigée selon la formule d'ABBOTT, par rapport au témoin.

Dose et usages				
Cultures	Ravageurs	Dose	Volume	Stades
Arbres fruitiers pommier (poirier, cognassier, nêfle, nashi, pomette), cerisier, pêcher (abricotier, nectarinier), prunier (jujube)	Acarien Puceron Cochenille	2,5 litres / hL	1000 à 1500 litres de bouillie par ha	Hiver BBCH 0-11 Appliquer Catane à partir du stade "arbre dormant" jusqu'aux premières feuilles étalées

Avantages techniques

- Large spectre d'action
- Pas de résistance des bioagresseurs
- Excellente sélectivité

Facilité d'usage

Liquide émulsionnable à pulvériser

- Sans classement toxicologique
- Exempté de LMR
- Sans DAR
- DRE minimum de 6h plein champ

3 conditionnements adaptés

20 L : code FR15020

208 L : code FR15050

1000 L : code FR15100

Composition

800 g / L huile de paraffine. EC-Concentré Emulsionnable.

Préparation de la bouillie

Verser la quantité de Catane® avec 2 à 3 fois son volume d'eau dans la cuve du pulvérisateur en agitant soigneusement. Compléter avec la quantité d'eau nécessaire.

Appliquer la bouillie immédiatement après sa préparation et veiller à maintenir une bonne homogénéisation pendant tout le traitement.

Conseils d'application

Mouiller abondamment toutes les parties à traiter, en particulier pour les traitements des cochenilles. Ajuster le volume de bouillie en fonction de la taille des arbres.

Ne pas traiter sur des arbres en condition de stress hydrique, pendant la floraison et lorsque la température est inférieure à 5°C ou supérieure à 30°C.

Incompatibilités

Ne pas utiliser en mélange avec les produits suivants : captane, folpel, soufre, ziram et thirame. Respecter un délai minimum de 15 jours entre une application de Catane® et les produits mentionnés ci-dessus.

Pour toute association avec un autre produit, faire un test préalable ou consulter le distributeur de votre région.

La législation évolue rapidement : vérifier les homologations des produits que vous utilisez pour vos cultures en particulier auprès du Ministère de l'Agriculture. FDS disponibles en ligne (quickfds.com).

Votre distributeur :

KOPPERT
BIOLOGICAL SYSTEMS