

CRYPTO

Croissance racinaire et végétative : le GREEN EFFECT.

Une nutrition minérale équilibrée quelque soit le stade d'application

Active la croissance racinaire latérale et en profondeur
Renforce et accompagne l'action de l'auxine

**Un chevelu racinaire dense et renforcé pour une plus grande
quantité d'éléments minéraux absorbés**

Améliore le fonctionnement de la photosynthèse

**CRYPTO améliore la nutrition, la photosynthèse
et la croissance racinaire**

Composition

Azote (N) : 120 g/L

Phosphore P_2O_5 : 50 g/L

Potassium (K_2O) : 100 g/L

+ Activateurs de croissance



Nutrisud

CRYPTO


Dès l'implantation
et tout au long du cycle.

Meilleure assimilation des éléments

Effet vigueur, améliore le développement foliaire et la croissance végétative au moment de l'implantation

Améliore la rhizogénése

Chevelu racinaire plus dense, surface d'échange et d'assimilation eau/nutriments multipliée



DOSE d'EMPLOI

APPLICATIONS SOL

Diluer CRYPTO à 0,5%-1% puis appliquer sous le rang au sol ou en fertirrigation

- > MARAICHAGE - Période : Repiquage ou jeunes plants à 10 L/ha
- > ARBORICULTURE - Période : A partir de début gonflement des bourgeons (BBCH 01) à 5 L/ha tous les 15 jours
- > VITICULTURE - Période : A partir du débourrement (BBCH 01) à 5 L/ha tous les 15 jours
- > POMME DE TERRE - Période : Levée (BBCH 9) à 10 L/ha
- > MAÏS - Période : 2-4 feuilles (BBCH 12 à 14) à 5 L/ha
- > BETTERAVE - Période : 4 feuilles (BBCH 14) à 5 L/ha
- > COLZA - Période : 4-6 feuilles (BBCH 14 à 16) à 5 L/ha
- > HARICOTS - Période : 5 cm (BBCH 14-15) à 5 L/ha

APPLICATIONS FOLIAIRES

Dose : 3 x 3 L/ha tous les 10-15 jours Concentration maximale : 3%

- > MARAICHAGE : sur feuillage suffisamment développé
- > JEUNES PLANTATIONS PERENNES (vigne, arbres fruitiers) : sur feuillage suffisamment développé
- > POMME DE TERRE : à partir du stade BBCH 41
- > MAÏS : à partir du stade BBCH 15
- > BETTERAVE : à partir du stade BBCH 15
- > COLZA : à partir du stade BBCH 16
- > HARICOTS : à partir du stade BBCH 16

Application en trempage : 1 mL par plant