




# DAHIDO

## UN NOUVEAU MOYEN POUR PROTÉGER VOS VIGNES

Dahido est composé d'un spectre varié de **polymères**. Lors de l'application, ces chaînes de polymères s'enchevêtrent et se **figent à la surface du végétal**. Le filet ainsi créé **immobilise l'insecte ravageur**. Les populations nuisibles sont donc rapidement éliminées.

La particularité de Dahido vient de son action, uniquement physique. Il n'entre donc pas dans le périmètre de la réglementation phytopharmaceutique.

**Sur vignes, il permet de contrôler les acariens.**



*Filet créé par Dahido à la surface de l'insecte (microscope à balayage)*

### LES + PRODUIT

Des niveaux **d'efficacité** similaires aux insecticides conventionnels contre l'acariose

Une matrice qui se dégrade rapidement (en des molécules simples) **sans aucun résidu**

Un mode d'action uniquement physique, permettant de **limiter l'apparition de résistances**

Un **produit flexible**, qui permet de protéger les jeunes vignes tout au long de la saison





## USAGES RECOMMANDÉS SUR VIGNES :

Ravageurs	Périodes d'application	Cadences	Concentration <sup>1</sup>	Volumes d'application
<b>Acariens</b>	Dès l'apparition des individus mobiles	2 à 3 applications à 7 jours d'intervalle	0,15%	Min 200 l/ha Max 500 l/ha

<sup>1</sup> La quantité de produit doit être calculée sur le volume de bouillie réellement appliqué.

## RECOMMANDATIONS D'UTILISATION SUR VIGNES :

### Volume de bouillie et conditions d'application

- Dahido agit par contact direct sur les acariens ravageurs, et doit donc s'utiliser sur **foyers déclarés**, à un stade précoce des ravageurs.
- Lors de l'application, il est indispensable que **couvrir toutes les parties de la culture** sur lesquelles le ravageur peut être présent. Le **volume de bouillie** conseillé sur jeunes vignes est de 200 à 500 l/ha.
- Dahido doit être utilisé sur un **feuillage ressuyé** et quand les conditions permettent un **séchage rapide** du produit. Il est indispensable de respecter les bonnes pratiques de pulvérisation.
- Ne pas mélanger Dahido avec des adjuvants, agents mouillants ou étalants.

### Positionnement en séquences

- Dahido s'applique en **séquences** de deux à trois traitements, à 7 jours d'intervalle. En cas de **fortes infestations**, il est recommandé de réaliser une deuxième séquence de deux à trois applications à 7 jours d'intervalle, 14 jours après la fin de la première séquence de deux applications.

### Utilisation en mélange

- Dahido peut être utilisé en mélange avec la plupart des produits phytosanitaires. Dans le cas d'un mélange, Dahido devra être ajouté en dernier dans la cuve.
- Au préalable, il est recommandé à l'utilisateur de réaliser un test de compatibilité physique (pré-empâtage) et un test de compatibilité biologique sur une petite partie de la culture.

