



Biofertilisant contenant
68% d'acides aminés libres
+ azote + potasse + activateur
de croissance & assimilation d'azote

Utilisable en
**AGRICULTURE
BIOLOGIQUE**
Selon la réglementation
en vigueur

GREENAMIN K



Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) N° : I 190372*

Produit utilisable en agriculture biologique en application du RCE n° 2018/848

GREENAMIN K est conçu pour tous types de cultures en application foliaire et fertirrigation pour promouvoir la synthèse des protéines, le transport de sucres et comme biostimulant



Effet Floraison / Nouaison




Amélioration de la croissance végétative



Amélioration de l'assimilation de l'azote



Effet anti-stress



Effet Culture



Effet Environnement



Effet Sol

APPLICATION AU SOL
Engrais
Conditionnement 5 Kg

Azote (N) Total : 9%
Azote (N) organique : 9%
Oxyde de potassium (K₂O) : 12%

Acides Aminés libres : 68%
dont acide glutamique : 37%
glycine : 31%

**Utilisation
TOUTES CULTURES**

ARBO

VIGNE

MARAÎCHAGE

CÉRÉALES



GREENAMIN K contient 68% d'acides aminés sous forme L-aminoacides, qui sont ceux que la plante peut utiliser car biologiquement actifs.
9% d'azote **EXCLUSIVEMENT ORGANIQUE**.
12% de potasse d'**ORIGINE NATURELLE** naturelle facilement assimilable par les cultures.

/ ECONOMIE D'ENERGIE POUR LA PLANTE

/ MAINTIEN DE LA PRODUCTIVITE EN SITUATION DE STRESS

DOSES ET STADES

DOSE DE 2 À 4 KG/HA - CONCENTRATION MAXI FOLIAIRE 5% - SOL/FERTIRRIGATION 0,5%

APPLICATION FOLIAIRE →

**APPLICATION AU SOL
FERTIRRIGATION :**

→ Dose conseillée 4 kg/ha
Concentration maximale
0,5 Kg pour 100 L eau



ARBO
2 à 4 Kg/ha

/ **ENCADREMENT DE FLORAISON**
en situation de stress végétatif.
/ 4 À 6 APPLICATIONS ESPACÉES
de 15 jours, dès le grossissement des
fruits et jusqu'à 2 semaines avant récolte.

VIGNE
2 à 4 Kg/ha

/ **ENCADREMENT DE FLORAISON
VÉGÉTATIF**
EN SITUATION DE STRESS
/ 2 À 4 APPLICATIONS ESPACÉES
DE 10 À 15 JOURS À PARTIR DU
STADE NOUVEAU.

MARAÎCHAGE
2 à 4 Kg/ha

/ 3 À 5 APPLICATIONS, tous les
10-15 jours dès le démarrage végétatif
(sur feuillage suffisamment développé).
/ **POMME DE TERRE** 3 À 4
APPLICATIONS à partir de début
tubérisation puis tous les 15 jours.

CÉRÉALES
0,5 à 2 Kg/ha

**SUR FEUILLAGE
SUSAMMENT DÉVELOPPÉ**

CONSEILS D'USAGES

APPLICATION

- ✓ Pour une efficacité optimale, utiliser un volume d'eau/ha suffisant pour obtenir une répartition homogène sur le feuillage.
- ✓ Préférer les traitements aux températures entre 6 et 25°C. Evitez les applications en cas de sécheresse, d'humidité importante, de gel, de pluie ou lorsque ces conditions sont attendues.
- ✓ Agiter le bidon pour homogénéisation. Verser progressivement le produit à travers un filtre, une fois la cuve à moitié remplie d'eau et le système d'agitation en marche. Maintenir l'agitation pendant toute la durée de l'application. Rincer l'emballage deux fois et nettoyez tous les équipements avant et après utilisation.

STOCKAGE

- ✓ Respecter un stockage entre 0°C et 35°C pour préserver l'intégrité du produit.
CONSERVER LE RECIPIENT BIEN FERME ET DANS UN ENDROIT SEC.

* Détenteur de l'AMM - AGRONUTRITION Parc Activestre - 3, avenue de l'orchidée- 31390 CARBONNE - France Tél : +33 (0)5 61 97 85 00

GREENAMIN K

NUTRISUD
Route de Sénas - 13113 LAMANON

