

FICHE D'IDENTITÉ

Composition et mode d'action	Clopyralid 720 g/Kg groupe HRAC O Mimétique de l'auxine
Famille chimique	Acide carboxylique pyridine
Formulation	(SG) Granulés solubles dans l'eau
 ZNT	5 m
 DRE	6 heures après traitement
Classement	Produit non classé

UTILISATIONS

Culture	Stade / Période	Doses	Recommandations
 COLZA	Du stade « montaison » au stade « boutons accolés » À partir du 15 février	140 – 174 g/Ha	Lutte contre dicotylédones annuelles et vivaces
 BETTERAVES INDUSTRIELLES, FOURRAGÈRES & POTAGÈRES	Stades cotylédons (B10) à fermeture des lignes (B39) À partir du 1 ^{er} avril	40 à 85 ⁽¹⁾ g/Ha En fractionné dans le cadre d'un programme 174 g/Ha ⁽¹⁾ 2x85 g/Ha ⁽²⁾	Lutte contre les dicotylédones annuelles Lutte contre les vivaces (chardon, laïterons)
 MAÏS	De la levée jusqu'au stade 10 feuilles du maïs	174 g/Ha 2 X 85 g/Ha ⁽²⁾	Lutte contre les vivaces, les repousses de tournesol, les datura, ...
 SORGHO	Du stade 4 à 8 feuilles du sorgho	174 g/Ha	Lutte contre les chardons, les repousses de tournesol et de pois
 LIN TEXTILE ET OLÉAGINEUX	Du stade 10 cm jusqu'au stade 40 cm du lin	174 g/Ha	Lutte contre les vivaces, les matricaires et autres composées, ...
CULTURES PORTE-GRAINE MINEURES ⁽³⁾			

⁽¹⁾ application unique

⁽²⁾ application fractionnées : ne pas dépasser 174 g/Ha par an. Intervalle maximal entre 2 applications = 15 jours.

⁽³⁾ oignon, poireau, ciboulette, navet, radis, chou, betterave potagère, poirée, œillet, lin rouge, épinard, roquette.

Sur les cultures suivantes : Sorgho, Betteraves potagères et Lin, ne pas appliquer de produit contenant du clopyralid plus d'une fois tous les 2 ans à la dose de 0,174 kg/Ha (125 g sa/Ha).

Lire attentivement l'étiquette avant l'utilisation du produit.



Lontrel SG™ : Granulés solubles dans l'eau (SG), contenant 720 g/Kg de Clopyralid*.

AMM N° 2110063 - Dow AgroSciences SAS. Non Classé, EUH401, NC.

Responsable de la mise en marché : Dow AgroSciences Distribution S.A.S.

371 rue Ludwig Van Beethoven 06560 Valbonne.

N° d'agrément PA00272 : Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels.  0 800 470 810

® TM : Marque de The Dow Chemical Company ('Dow') ou d'une société affiliée.

* Substance active brevetée et fabriquée par Dow AgroSciences. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette des produits et/ou sur www.phytodata.com.



Dow AgroSciences

Solutions for the Growing World™

UN CONCENTRÉ D'EFFICACITÉ ET D'AVANTAGES MULTICULTURES

Décembre 2015



Lontrel SG™
HERBICIDE

Herbicide de postlevée, multicultures, en granules solubles
contre les antidicotylédones annuelles et vivaces




Dow AgroSciences

Solutions for the Growing World™

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

UN MODE D'ACTION UNIQUE

- Efficacité de Lontrel™ SG
La matière active de Lontrel™ SG est reconnue pour son efficacité en postlevée dans la lutte contre de nombreuses espèces dicotylédones difficiles à détruire, en particulier : Composées, Ombellifères, Polygonacées, Légumineuses.
- Sélectivité de Lontrel™ SG
Lontrel™ SG est parfaitement sélectif des cultures suivantes : betteraves industrielle et fourragère, betterave potagère, colza, maïs, sorgho, cultures porte-graine mineures, lin textile et oléagineux.
- Systémie de Lontrel™ SG détruit les adventices jusqu'aux racines
La matière active de Lontrel™ SG est véhiculée par la sève jusqu'aux racines et/ou rhizomes. Grâce à son excellente systémie, les vivaces ciblées sont détruites en profondeur.



6 AVANTAGES DE LA FORMULATION GRANULÉS SOLUBLES

- Ne gèle pas
- Moins d'emballage
- Facile à doser
- Dissolution instantanée
- Inutile de rincer
- Facile à manipuler

L'adjonction d'adjuvant pour bouillie herbicide, à la dose recommandée par le fabricant, permet de régulariser l'action du Lontrel™ SG. Traiter par « temps poussant » sur les adventices.

ANNUELLES	STADES		
	PLANTULES	JEUNE	DÉVELOPPÉ
COMPOSÉES			
Anthémis			
Matricaires			
Centaurée Bleuet			
Chrysanthème des moissons			
Séneçon commun			
Laiterons			
Bident tripartit			
Repousses de tournesol			
Helminthie fausse vipérine			
Lampsrane commune			
Érigéron du Canada			
Ambroisie à feuille d'armoise			
Picris			
OMBELLIFÈRES			
Éthuse			
Ammi élevé			
Anthriscue commun			
Scandix peigne de Vénus			
Torilis des champs			
POLYGONACÉES			
Renouée liseron			
Renouée des oiseaux			
Renouée persicaire			
LÉGUMINEUSES			
Vesce cultivée			
Repousse de pois			
SOLANACÉES			
Morelle noire			
Datura stramoine			
VIVACES			
COMPOSÉES			
Chardon des champs			
Laiteron des champs			
Tussilage pas d'âne			
Armoise vulgaire			
Pissenlit dent de lion			
Repousses de chicorées			
POLYGONACÉES			
Rumex			
Renouée amphibie			
LÉGUMINEUSES			
Gesse tubéreuse			
Trèfle			
Repousses de luzerne			
SOLANACÉES			
Repousses de pomme de terre			

Très bonneBonneVariable