

Madex® Twin

Mode d'emploi

FR

Généralités / Mode d'action

Madex® Twin est un insecticide biologique à base d'un virus spécifique (virus de la granulose) contre les larves du carpocapse des pommes et de la tordeuse orientale du pêcher (TOP). Madex® Twin est hautement sélectif et n'a aucun effet négatif sur les auxiliaires et autres insectes.

Emploi

Madex® Twin agit uniquement par ingestion contre les jeunes larves du carpocapse des pommes et de TOP. Appliquer Madex® Twin juste avant et pendant la période d'éclosion des larves. Pour cela, observez les indications d'Andermatt Biocontrol et des services phytosanitaires ou consultez le site www.sopra.info

Arboriculture

50 à 100 ml/ha selon la pression du ravageur et la fréquence d'application (stratégie de lutte) contre les chenilles du carpocapse de pommes et de TOP. En Suisse, les chenilles de TOP peuvent éclore continuellement de fin avril à fin septembre et celles du carpocapse des pommes de fin mai à septembre. En cas

d'applications régulières et continues durant une longue période, appliquer 50 ml/ha. En cas de forte pression du ravageur ou d'un nombre réduit d'applications, appliquer de préférence 100 ml/ha. Répéter les applications à intervalle de 8 jours ensoleillés (2 jours partiellement ensoleillés = 1 jour ensoleillé).

Délai d'attente

1 semaine

Préparation de la bouillie

Remplir le pulvérisateur avec $\frac{3}{4}$ du volume d'eau nécessaire, enclencher le brasseur, puis ajouter la quantité de Madex® Twin nécessaire. Ajouter les partenaires de mélange éventuels, puis compléter avec l'eau manquante. Pour les hautes tiges: 100 ml dans 1000 l d'eau. Pulvériser rapidement et de manière homogène la totalité de la bouillie.

Miscibilité

Madex® Twin est miscible avec les fongicides et insecticides usuels, ainsi que la plupart des produits phytosanitaires et engrais foliaires d'Andermatt Biocontrol. Ne pas mélanger Madex® Twin avec des produits acidifiants (pH de la bouillie < 5) tels Myco-San/Myco-Sin, ni avec des produits alcalins (pH de la bouillie > 8,5) tels Biofa Cocana, Natural, ni avec les préparations contenant du cuivre.

FR

Conservation et stockage

Pour un stockage de courte durée, conserver Madex® Twin au réfrigérateur (5 °C), au sec et à l'abri de la lumière. Congelé (-18 °C), le produit se conserve plusieurs années sans diminution d'efficacité.

Transport

Aucune restriction. Pendant le transport, la température ne doit pas excéder 25 °C, ni la durée 48 h.

Responsabilité

Andermatt Biocontrol SA garantit la qualité irréprochable du produit. Elle décline cependant toute responsabilité pour des pertes d'efficacité en cas de non respect du mode d'emploi.

Premier secours

Remarques générales:

Aucune mesure particulière n'est requise.

Après inhalation:

Donner de l'air frais. Assistance respiratoire si nécessaire. Tenir le malade au chaud. Si les troubles persistent, consulter un médecin. L'inspiration est possible seulement lors de produit chauffer.

Après contact avec la peau:

Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. Laver immédiatement à l'eau. En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin.

Après contact avec les yeux:

Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières. Si les troubles persistent, consulter un médecin.

FR

Après ingestion:

Si les troubles persistent, consulter un médecin. Aucune symptômes et effet connu.

Indications destinées au médecin

Traitement:

Traitement symptomatique (décontamination, fonction vital), aucune antidote connue.

FR