



Fongicide vigne

BLACKDART

*La double performance oïdium **et** black-rot*



**Double
action**



**Top
sur oïdium**



**Top
sur black-rot**



**Souple
d'emploi**



**Un pack pour 10 à 12 ha
selon la pression oïdium / black-rot**

2 x 10L Dartagnan® + 3 X 0,5L Pupitre®

associer impérativement les deux spécialité pour obtenir l'efficacité voulue

phyteurop

BLACKDART

Performance


La combinaison de deux spécialités aux modes d'action et aux performances complémentaires assure une protection "haut de gamme" pour le complexe oïdium/black-rot.

EFFICACITÉ OÏDIUM

Moyenne de 4 essais
2 applications non consécutives

EFFICACITÉ BLACK-ROT

Moyenne de 3 essais
3 Applications en comparaison



Bénéfices

- **La systémie** : les organes néoformés sont protégés.
- **L'oïdium** : L'association soufre + IDM booste et régularise l'efficacité.
- **Le black-rot** : en cas de forte pression utiliser un pack pour 10 ha.
- **14 jours** de tranquillité et de disponibilité pour les autres travaux.
- **La souplesse** : 10 à 12 ha selon la pression oïdium / black-rot.
- **Pas d'odeur** lors du traitement.

Positionnement et dose

Black Dart se positionne aux périodes de grandes sensibilité sur les deux maladies (oïdium et black-rot) avec 14 j. de protection.

Utiliser 1 Pack Black Dart pour 10 ha en fortes pressions et pour 12 ha en pression modérée.



Pupitre® : Composition : diféniconazole 250 g/L, Formulation : (EC) concentré émulsionnable, AMM : 2200905 (PHYTEUROP), DRE : 24 heures.

Dartagnan® : Composition : soufre micronisé 800 g/L, Formulation : (SC) suspensions concentrées, AMM : 8300063 (PHYTEUROP), DRE : 6h à l'extérieur et 8h en milieu fermé.

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit et/ou www.phyteurop.fr. Agrément numéro IF01755 : distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. Distribué par Phyteurop : 83 avenue de la Grande Armée 75782 PARIS CEDEX 16 Tél. : 01 47 59 77 00 - 11 2023

phyteurop®

DARTAGNAN®

EUH208 Contient de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement

PUPITRE®

Danger

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.