

# NOUVEAU MODE D'ACTION À FORTE DIFFUSION POUR GÉRER LE MILDIOU SUR LÉGUMES EN PROGRAMME

 **Santhal® Gold**



 **Santhal® Gold**

**Composition :** 465,2 g/L de metalaxyl-M

**Formulation :** Concentré Soluble (SL)

**Famille des phénylamides**

**Intervalle entre 2 applications :** 7 jours

**ZNT Aquatique :** 5 mètres

**Phrases de risque :** H302, H319

**DSPPR :** 3 mètres

**DRE :** 24 heures

**Emballages :** 1L et 5L

## ASSOCIATION OBLIGATOIRE

pour les usages mildiou avec un partenaire efficace sur cette cible pour limiter l'apparition de résistances

**SANTHAL® Gold** est un fongicide doté d'une excellente capacité de diffusion dans le végétal. Cette caractéristique lui permet de protéger efficacement les feuilles nouvelles et en croissance, et d'être protégé du lessivage.

- Protection fongicide **haut de gamme**
- **Mode d'action complémentaire** pour renforcer la durabilité des programmes
- **Largeur d'étiquette** pour les légumes et la pomme de terre
- **Flexibilité de positionnement** sur les cultures
- Produit **compatible en mélange**
- **Produit adapté** à de nombreux cahier des charges de production.

CULTURES AUTORISÉES, UNIQUEMENT	CIBLES	DOSE AMM	NOMBRE MAX. D'APPLI.	STADE D'APPLI.	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE (DAR)
Oignon / Ail / Echalote	Mildiou	0,2L/ha	1/an	BBCH 15 - 49	14 jours
Melon / Pastèque <i>Également autorisé sous abri</i>	Mildiou	0,2L/ha	2/an	BBCH 21 - 81	3 jours
Chou-fleur / Brocoli	Mildiou	0,2L/ha	1/an	BBCH 11 - 49	20 jours
Chou pommé	Mildiou	0,2L/ha	1/an	BBCH 11 - 49	30 jours
Laitue / Scarole / Frisée / Mâche / Roquette / Jeunes pousses Epinard / Feuilles de Bettes Pourpier Cresson alenois Fines herbes <i>Également autorisé sous abri</i>	Mildiou	0,2L/ha	1/an	BBCH 11 - 49	10 jours
Tomate <i>Également autorisé sous abri</i> Dose d'application de 0,1L/10000m <sup>2</sup> de haie foliaire sans dépasser la dose maximale de 0,2L/ha	Mildiou	0,2L/ha	2/an	BBCH 15 - 84	3 jours
Concombre <i>Également autorisé sous abri</i>	Mildiou	0,2L/ha	1/an plein champ 2/an sous abri	BBCH 13 - 81	3 jours plein champ 14 jours sous abri
Poireau / Oignon de printemps / Ciboule	Mildiou	0,2L/ha	1/an	BBCH 15 - 49	14 jours
Pomme de terre	Mildiou	0,2L/ha	2/an	BBCH 11 - 49	14 jours
Carotte	Maladie de la bague	0,47L/ha	1/an	BBCH 10 - 13	80 jours
Mâche	Pythiacées	0,47L/ha	1/an	BBCH 10 - 11	40 jours

Pour l'ensemble des usages, se reporter à l'étiquette du produit ou sur la fiche produit sur notre site internet [www.syngenta.fr](http://www.syngenta.fr)

Renseignements Techniques **0 825 00 05 52** Service 0,15 € / min + prix appel  
[renseignements.techniques@syngenta.com](mailto:renseignements.techniques@syngenta.com)

