

CELSIUS

Un concentré de bonus !



VÉRITABLE
TYPE SUD



PRODUCTION
TOTALE

14,2

VERTICILLIOSE 4,7



LUZERNE
TYPE SUD
ID 6,7

Des semences professionnelles pour les professionnels



CELSIUS


4
ANS

LUZERNE TYPE SUD
ID 6,7



PRODUCTION T/MS

- Production totale
- Production de printemps
- Production été-automne



EXPLOITATION

- PÉRENNITÉ 8,2
- DATE DÉPART VÉGÉTATION 26 MARS
- DORMANCE 6,7
- VERSE 5,1
- VIGUEUR EN SORTIE D'HIVER 7,8

L'enrobage de la semence avec un inoculant contenant une bactérie (*Sinorhizobium meliloti*) favorisera la fixation symbiotique de l'azote de l'air par nodulation de la luzerne par cette bactérie.



VALEURS ALIMENTAIRES* %/MS

UFL
0,75

« Les valeurs peuvent évoluer selon le mode valorisation de la luzerne et du stade d'exploitation »



TOLÉRANCE

- NÉMATODES 4,2
- VERTICILLIOSE 4,7
- ANTHRACNOSE 4,6
- MALADIES DIVERSES 6,5

Sources inra et semae

FERTILISATION

- Veiller à maintenir un pH correct « entre 6 et 6.5 » et une bonne teneur en potasse.

Source Herbe-book 2026
selon nouvelle méthode MODÈLE MIXTE

DOSE SEMIS
PRINTEMPS
20
kg/ha
AUTOMNE
25
kg/ha
15-20 kg/ha association

LES SEMIS

PÉRIODES DE SEMIS

- De la mi-avril à début mai
- De fin août à début septembre

PROFONDEUR DE SEMIS

- Semis superficiel

TYPE DE SOL

- Dans un sol avec un pH de 6 à 6.5

CONSEILS SEMIS

Veiller à ce que la parcelle soit propre avant de semer pour limiter le salissement en début de cycle. Possibilité de réaliser un faux-semis ou désherbage en amont de l'implantation. Le lit de semences doit être bien rappuyé en profondeur et fin en surface pour permettre un bon contact terre/graine. Roulage après semis conseillé pour uniformiser la levée.



Attention pour les parcelles ayant reçu dans l'année un désherbage à base de sulfonilurée : labour obligatoire.

fourrageres@eliard-spcp.fr



ZI 9 rue Lavoisier - BP 14 - 56301 PONTIVY Cedex
Tél : 02 97 25 50 12 - Fax : 02 97 25 65 59
eliard-spcp.fr

