


Lidea

FRESH IDEAS FOR AGRICULTURE

CLARA

Vesce de Narbonne

- **Facilité d'implantation**
- **Très bon précédent**
- **Double valorisation**

CLARA

Vesce de Narbonne



Profil variétal

Famille : Fabacées (légumineuses)

Espèce : *Vicia narbonensis*

Vitesse d'implantation : moyenne

Couverture de sol : bonne

Port de plante : dressé

Système racinaire : pivotant

Rapport C/N : faible (10-15)

Part d'N minéralisable : 50%



L'essentiel

Facilité d'implantation

- **CLARA** est une alternative intéressante à la féverole. Son petit PMG autorise l'association avec d'autres espèces et permet de semer en un seul passage.

Très bon précédent

- Les propriétés fixatrices de **CLARA** sont parmi les plus efficaces de la famille des légumineuses. Capable de fixer jusqu'à 160 U, ses restitutions importantes en font un excellent précédent cultural.

Double valorisation

- **CLARA** est une interculture intéressante en tant qu'engrais vert. En valorisation fourragère, il est conseillé de l'associer avec une céréale d'hiver ou un seigle multicaule.

Cultures dans la rotation bénéficiant du couvert



Blé Maïs Betterave

Conseils

Conseils de culture

- Assurer le bon enterrage de la graine (2 à 3cm).
- En zones vulnérables, l'implantation de légumineuses en pur peut être proscrite.
- Conseillée en association avec des céréales (méteils).

Restitutions potentielles


Pour un couvert à (t/MS/ha)

	4	5	6
N	50	60	80
P	10	20	25
K	90	135	180

Méthode MERCI

Semis

- Densité : 100 kg/ha à 2-3 cm de profondeur
- PMG : +/- 200 g
- Pieds/m²: 45 plantes à 80 kg/ha
- Dates de semis optimales :



Destruction

- Exportation : valorisation fourragère
- Gel : -6 à -10°C, stade de floraison
- Roulage + gel : en hiver doux

Lidea
FRESH IDEAS FOR AGRICULTURE

Les renseignements fournis dans ce document ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions agronomiques et climatiques, ainsi que des techniques culturales.
La résistance aux maladies concerne les maladies ou souches actuellement connues en France. Mars 2019.
Source: R&D LIDEA