



Prévention
et traitement
des déficiences en Bore



SUDBORE



CE Engrais Règlement 2019/1009

Produit utilisable en agriculture biologique en application du RCE n° 2018/48

SUDBORE prévient et corrige les déficiences en Bore de toutes les cultures par application foliaire ou au sol

CARENCES EN BORE

Sur Vigne



Le Bore joue un rôle important au niveau de la plante :

- ✓ Rôle sur la fécondation – nouaison
- ✓ Migration des sucres
- ✓ Synthèse des protéines
- ✓ Activité méristématique et croissance
- ✓ Utilisation des auxines dans la plante

APPLICATION AU SOL ET FOLIAIRE
Formulation liquide
Conditionnement 10 L

Bore éthanolamine : 150 g/L

Utilisation
TOUTES CULTURES

ARBO

VIGNE

MARAÎCHAGE

GRANDES
CULTURES

SUDBORE est fortement concentré en Bore prévenant et corrigeant ainsi efficacement la déficience en Bore qui a des répercussions importantes sur le rendement ou la qualité de la récolte : tournesol, betterave, luzerne, colza, arbres fruitiers, vigne, légumes de plein champ.

SUDBORE est formulé à partir de matières premières sélectionnées, pour assurer une parfaite sécurité d'emploi et une répartition homogène du produit sur le sol ou le feuillage.

DOSES ET STADES

DOSE DE 1 À 3 L/HA

APPLICATION SOL ET FOLIAIRE →

APPLICATION AU SOL

→ Toutes Cultures 6 à 8 L/HA

De préférence avant l'implantation de la culture.

Sur vigne avant débourrement.



ARBO 1 à 3 L/ha

/ 1 À 2 L/HA aux stades boutons roses

- début floraison

- chute des pétales

/ 3 L/HA à l'Automne,

juste après la cueillette

avant la senescence des feuilles pour la mise en réserve

/ AGRUMES

1 À 2 L/HA

2 à 4 applications dans l'année

Volume d'eau : 500 - 1000 L/HA

VIGNE 1 à 2 L/ha

/ STADES :

GRAPPES

SÉPARÉES -

BOUTONS

FLORAUX

SÉPARÉS

- NOUAISON

VOLUME D'EAU : 500-1 000 L/HA

MARAÎCHAGE 3 L/ha

/ STADES : 1 À 2

APPLICATIONS

SUR FEUILLAGE

SUFFISAMMENT

DÉVELOPPÉ

VOLUME D'EAU :

200 L/HA

GRANDES CULTURES 1 à 3 L/ha

/ TOURNESOL -

3 L/HA : 1 à 2

applications du stade 5

paires de feuilles à

bouton étoilé.

/ BETTERAVES -

3 L/HA : 4-6 feuilles -

Fermeture de rang (sur

betteraves porte graines,

prévoir 4 applications

de 1 à 2 L/ha aux stades

"reprise de végétation",

"début montaison", "après

écimage" et "début floraison")

/ COLZA - 3 L/HA :

1 à 2 applications du stade

rosette à début floraison.

/ LUZERNE - 3 L/HA :

1 à 2 applications du stade

reprise à préfloraison.

Volume d'eau : 200 L/HA

CONSEILS D'USAGES

APPLICATION

- / Pour une efficacité optimale, utiliser un volume d'eau/ha suffisant pour obtenir une répartition homogène sur le feuillage.
- / Préférer les traitements aux températures entre 6 et 25 ° C. Evitez les applications en cas de sécheresse, d'humidité importante, de gel, de pluie ou lorsque ces conditions sont attendues.
- / Agiter le bidon pour homogénéisation. Verser progressivement le produit à travers un filtre, une fois la cuve à moitié remplie d'eau et le système d'agitation en marche. Maintenir l'agitation pendant toute la durée de l'application. Rincer l'emballage deux fois et nettoyez tous les équipements avant et après utilisation.

STOCKAGE

- / Respecter un stockage entre 0°C et 35°C pour préserver l'intégrité du produit.
CONSERVER LE RECIPIENT BIEN FERMÉ ET DANS UN ENDROIT SEC.

SUDBORE

NUTRISUD
Route de Sénas - 13113 LAMANON

